

# ERIDOKSIN®

Water Soluble Powder  
Treatment Against CRD  
Coryza & Fowl Cholera



1000 g

## COMPOSITION:

Each Gram contains

Erythromycin \_\_\_\_\_ 40 mg

Doxycycline \_\_\_\_\_ 20 mg

## DESCRIPTION

ERIDOKSIN is a combination of 2 antibiotics with broad spectrum activity against various pathogens.

ERIDOKSIN is effective against diseases caused by mycoplasma, gram negative and gram positive bacteria.

## INDICATIONS:

ERIDOKSIN is indicated for CRD, infectious coryza fowl cholera, colibacillosis, staphylococcosis streptococcosis and other infections.

## DOSAGE AND DIRECTION FOR USE

Dissolve 1 - 2 g of ERIDOKSIN in every liter of drinking water or 1 g per 5 kg body weight.

Give for 3 - 5 consecutive days.

## PRECAUTIONS

Change drinking water everyday and new solution must be made daily.

Animal should be slaughtered only after 1- 2 days of the last treatment.

Reg. No. 059185

Batch No.:

Mfg. Date:

Expiry Date:

Manufactured by : PT SANBE FARMA  
Bandung - Indonesia

## ایریڈوکسین

### اجزائے ترکیبی:

ایک گرام سفوف میں شامل ہے۔

40 ملی گرام ارتھرومائیسین

20 ملی گرام ڈوکسی سائیکلین

### ہدایات:

ایریڈوکسین میں 2 انتہائی وسیع الاثر انٹی بائیوٹکس ارتھرومائیسین اور ڈوکسی سائیکلین شامل ہیں جس کی وجہ سے یہ گرام نیگیٹیو بیکٹریا، گرام پازیٹیو بیکٹریا اور مائیکوپلازما کے خلاف بہت موثر ہے۔

### علامات:

ایریڈوکسین سی آر ڈی، انفیکشنس کورائزہ، فاول کالرا، کولی بیسی لاسسز، سٹیفاکیلوکوکوسسز، سٹریپٹوکوکوسسز اور دیگر بیماریوں کے خلاف بہت موثر ہے۔ جو کہ گرام نیگیٹیو بیکٹریا، گرام پازیٹیو بیکٹریا اور مائیکوپلازما سے پیدا ہوتی ہیں۔


### خوراک:

1 سے 2 گرام فی لیٹر پینے کے پانی میں یا ایک گرام فی 5 کلوگرام جسمانی وزن کے حساب سے 3 سے 5 دن تک استعمال کریں۔

### احتیاطی تدابیر:

دوائی ملا پانی 24 گھنٹے کے اندر استعمال کریں۔

جانور دوائی استعمال کرنے کے کم از کم 2 دن بعد ذبح کریں۔



Sole Distributor  
**BIOCURE**  
PHARMACEUTICALS PTE.  
Lahore - Pakistan